



0000055555

İkili Tarama Testi Hasta Bilgi Formu [Birinci Trimester]

Adı	
Soyadı	
Doğum Tarihi	
Serumun Alınış Tarihi	
Son Adet Tarihi	

Ultrasound Bilgisi

CRL Ölçümü (mm) (min. 38mm, max. 84mm olmalıdır.)	
Ultrasound Tarihi	
Nuchal Translucency Ölçümü (NT)(mm)	
Nasal Bone	<input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok <input type="checkbox"/> Bilinmiyor
Ölçümü Yapan Doktor	
Klinik Olarak Gebelik Haftası	

Düzenleme Faktörleri

Serum Alınış Tarihindeki Kilo (kg)			
Sigara	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	
İnsüline Bağlı Diyabet	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	
IVF	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	
İkiz Gebelik	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	
Etnik Köken	<input type="checkbox"/> Afrikalı	<input type="checkbox"/> Asyalı	<input type="checkbox"/> Beyaz

Laboratuvarda Kullanılacak Bölüm

Biyokimyasal Testler	İkili Test
	Free Beta-hCG (ng/mL)
	PAPP-A (mIU/mL)

- Bu test gebeliğin 10 ile 13 hafta 6 günlük evrelerinde yapılmalıdır. Kombine risk hesaplaması için mutlaka CRL ölçüm değerinin belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca ölçülen CRL değeri 38mm den büyük, 84mm den küçük olmalıdır.
- Numune alımı ile USG ölçümü aynı gün yapılmalıdır.
- Yukarıdaki soruların yanıtlanması, risk belirlemede yardımcı olacaktır. Verilecek yanıtlar gizli tutulacaktır.

Laboratuvarımız TS EN ISO 15189 akreditasyonuna sahip, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir laboratuvardır