



0000055555

Üçlü-Dörtlü Tarama Testi Hasta Bilgi Formu [İkinci Trimester]

Adı	
Soyadı	
Doğum Tarihi	
Serumun Alınış Tarihi	
Son Adet Tarihi	

Ultrasound Bilgisi

Ultrasound Tarihi	
BPD Ölçümü (mm) (min. 27mm, max. 56mm olmalıdır.)	
Ölçümü Yapan Doktor	
Klinik Olarak Gebelik Haftası	

Düzenleme Faktörleri

Serum Alınış Tarihindeki Kilo (kg)			
Sigara	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	
İnsüline Bağlı Diyabet	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	
IVF	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	
İkiz Gebelik	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	
Etnik Köken	<input type="checkbox"/> Afrikalı	<input type="checkbox"/> Asyalı	<input type="checkbox"/> Beyaz

Laboratuvarda Kullanılacak Bölüm

Biyokimyasal Testler	Üçlü Test	Dörtlü Test
	AFP (ng/ml)	AFP (ng/ml)
	Beta-hCG (mIU/mL)	Beta-hCG (mIU/mL)
	E3 (ng/mL)	E3 (ng/mL)
		İnhibin A (pg/mL)

- Bu test gebeliğin 15 ile 21 hafta + 6 günlük evrelerinde yapılmalıdır.
- Numune alımı ile USG ölçümü aynı gün yapılmalıdır.
- Yukarıdaki soruların yanıtlanması, risk belirlemede yardımcı olacaktır. Verilecek yanıtlar gizli tutulacaktır.